



Nr. 2 Frischwiese/Fettwiese 2025
Ursprungsgebiet (UG) 17

Südliches Alpenvorland und angrenzende

Ansaatzstärke: 3 g/m² (30 kg/ha)

Im Fall von abweichenden Herkünften:

Ansaat in der freien Landschaft nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde!

| Wildblumen 30% | | | % | Herkunft |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------|
| Botanischer Name | Deutscher Name | | | |
| Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | | 1,00 | UG 17 |
| Anthriscus sylvestris | Wiesen-Kerbel | | 0,50 | UG 16 |
| Campanula patula | Wiesen-Glockenblume | | 0,10 | UG 16 |
| Carum carvi | Wiesen-Kümmel | | 2,50 | UG 16 |
| Centaurea cyanus | Kornblume | | 2,50 | UG 16 |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | | 2,00 | UG 17 |
| Crepis biennis | Wiesen-Pippau | | 0,60 | UG 17 |
| Daucus carota | Wilde Möhre | | 1,50 | UG 17 |
| Galium album | Weißes Labkraut | | 1,50 | UG 16 |
| Knautia arvensis | Acker-Witwenblume | | 0,80 | UG 16 |
| Leontodon hispidus | Rauer Löwenzahn | | 0,30 | UG 17 |
| Leucanthemum ircutianum/vulgare | Wiesen-Margerite | | 3,00 | UG 17 |
| Lotus corniculatus | Hornschotenklee | | 1,20 | UG 16 |
| Lychnis flos-cuculi | Kuckucks-Lichtnelke | | 0,40 | UG 17 |
| Papaver rhoeas | Klatschmohn | | 1,30 | UG 16 |
| Pimpinella major | Große Bibernelle | | 0,40 | UG 16 |
| Plantago lanceolata | Spitzwegerich | | 2,60 | UG 17 |
| Prunella vulgaris | Gewöhnliche Braunelle | | 1,00 | UG 16 |
| Rumex acetosa | Wiesen-Sauerampfer | | 0,50 | UG 17 |
| Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | | 1,00 | UG 16 |
| Sanguisorba minor | Kleiner Wiesenknopf | | 1,20 | UG 16 |
| Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf | | 0,30 | UG 16 |
| Scorzoneroides autumnalis | Herbst-Löwenzahn | | 0,30 | UG 16 |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke | | 1,00 | UG 16 |
| Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | | 1,00 | UG 16 |
| Tragopogon pratensis | Wiesen-Bocksbart | | 1,00 | UG 16 |
| Trifolium pratense | Rotklee | | 0,50 | UG 17 |
| | | | 30,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Wildgräser 70% | | | | |
| Alopecurus pratensis | Wiesen-Fuchsschwanz | | 3,00 | UG 16 |
| Anthoxanthum odoratum | Gewöhnliches Ruchgras | | 4,00 | UG 16 |
| Arrhenatherum elatius | Glatthafer | | 2,00 | UG 16 |
| Bromus hordeaceus | Weiche Tresse | | 4,00 | UG 16 |
| Cynosurus cristatus | Weide-Kammgras | | 9,00 | UG 16 |
| Dactylis glomerata | Gewöhnliches Knäuelgras | | 2,00 | UG 16 |
| Festuca pratensis | Wiesenschwingel | | 8,00 | UG 17 |
| Festuca rubra | Horst-Rotschwingel | | 19,00 | UG 16 |
| Helictotrichon pubescens | Flaumiger Wiesenhafer | | 2,00 | UG 16 |
| Poa angustifolia | Schmalblättriges Rispengras | | 6,00 | UG 16 |
| Poa pratensis | Wiesen-Rispengras | | 8,00 | UG 16 |
| Trisetum flavescens | Goldhafer | | 3,00 | UG 16 |
| | | | 70,00 | |
| | | | | |
| Gesamt | | | 100,00 | |